



LES SEINS

Note d'information sur la chirurgie d'embellissement des seins

Indication

Cette chirurgie est proposée à toutes les femmes souffrant d'une chute accompagnée ou non d'un volume excessif de la poitrine. Cette intervention se pratique très couramment. Elle ne présente pas de risque pour la glande mammaire. La glande retirée est analysée par un laboratoire d'histopathologie.

Un allaitement ultérieur est possible dans de nombreux cas.

Une modification temporaire de la sensibilité du mamelon peut survenir.

Avant l'intervention, une étude photographique permet de définir la technique à utiliser et le volume définitif souhaité ; une mammographie vous sera demandée dans certain cas.

Un bilan clinique et des examens de laboratoire vérifient la qualité de la glande et le bon état de santé.

Il est préférable de subir cette intervention en dehors de la période des règles.

L'anesthésie

L'intervention qui dure de 2h00 à 2h30 est pratiquée en clinique sous anesthésie générale avec 24 h d'hospitalisation. La poitrine est modelée pour obtenir des seins symétriques et d'aspect naturel.

Les suites opératoires immédiates

Elles ne sont pas vraiment douloureuses, une sensation de tension peut durer pendant une quinzaine de jours. Un hématome peut toujours survenir dans les suites mais ceci est rare dans le cas de la réduction mammaire.

Les suites opératoires secondaires

Le patient est suivi régulièrement par l'équipe médicale et chirurgicale, avec un pansement au huitième et au quinzième jour. Des visites régulières lors des 3 premiers mois permettent de suivre l'évolution des cicatrices.

Des pansements spécifiques peuvent être appliqués à la fin du premier mois pour atténuer les rougeurs et aplanir les cicatrices. Toutefois, il persistera toujours une cicatrice résiduelle mais par la suite celle-ci pourra être imperceptible entre 12 et 18 mois.

L'aspect des cicatrices, qui vous sera expliqué par le chirurgien, dépendra de l'indication de départ, de la technique employée, du type de peau.

Résultat

La forme et le volume définitif sont obtenus entre trois et six mois.

Les reprises sont rares. Toutefois, il peut s'agir de symétriser une aréole, un sein ou de corriger une cicatrice hypertrophique.

Les complications

Une intervention de chirurgie esthétique est une intervention à part entière.

Outre les complications infectieuses et cicatricielles toujours possibles, des complications imprévisibles peuvent survenir, le tabac et une mauvaise hygiène de vie les favorisent.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter.