


**CLINIQUE DE CHIRURGIE ESTHETIQUE ALPHAND**  
(Agréée par le ministère de la santé)  
12, AVENUE ALPHAND – 75 116 PARIS  
TEL : 01.45.00.10.88 – FAX : 01.40.67.10.52



## LIFTING CERVICO-FACIAL OU LIFTING COMPLET

Cette intervention de rajeunissement peut se pratiquer dès l'âge de 50 ans pour les patients (es) qui présentent un vieillissement des joues, du cou et de l'ensemble des traits.

Elle permet de replacer sans mise en tension importante, l'ensemble des structures du visage (pommettes, région des maxillaires, région sous mentonnière et cou) pour donner un aspect global de rajeunissement. Le principe étant d'accompagner le vieillissement afin que le naturel des traits ne soit pas modifié. Lorsque la peau présente des cassures cutanées importantes, des techniques de médecine esthétique complémentaire sont à prévoir.

Au cours du lifting, des gestes associés peuvent venir compléter l'action traditionnelle du lifting :

- Lipo-aspiration de l'excédent graisseux au niveau du cou ou des bajoues,
- Réinjection de graisse (filling, restructuration) au niveau des pommettes, des bajoues ou du menton,
- Gommage par dermabrasion de la lèvre,
- Injection des lèvres...

Peuvent venir compléter l'action traditionnelle du lifting.

Cette intervention a subi beaucoup d'évolution et les suites opératoires sont dans l'ensemble plus rapides, une reprise de l'activité sociale vers le 10<sup>ème</sup> jour est possible.

Il faudra pourtant penser à camoufler les cicatrices qui peuvent rester visibles pendant les deux premiers mois.

Elles commencent sous la patte de cheveux et peuvent dans certains cas remonter dans le cuir chevelu. Elles continuent en passant au ras de l'oreille, contourne le lobe puis remonte dans le pli rétroauriculaire et se perdent dans le cuir chevelu.

Cette incision varie pour chaque patient et vous en discuterez avec votre chirurgien.

Les phénomènes post-opératoires sont peu douloureux, toutefois un œdème résiduel peut perdurer pendant le premier mois. Votre visage paraîtra plus rond, vous pourrez avoir l'impression d'avoir la tête « dans un étau » et une modification de la sensibilité pourra persister au-delà de 3 mois.

Un programme d'accompagnement de votre vieillissement vous sera proposé pour optimiser les suites du lifting.