


CLINIQUE DE CHIRURGIE ESTHETIQUE ALPHAND
(Agréée par le ministère de la santé)
12, AVENUE ALPHAND – 75 116 PARIS
TEL : 01.45.00.10.88 – FAX : 01.40.67.10.52



LIFTING DES BRAS

Cette intervention est indiquée chez les femmes présentant un relâchement cutané des deux tiers supérieurs du bras, soit à la suite d'un amaigrissement, soit à la suite d'un vieillissement précoce de la région.

Il existe deux techniques :

Une technique avec une cicatrice horizontale tout le long de la face profonde du bras qui est réservée dans les cas d'un affaissement très important du bras, généralement chez les personnes de plus de 70 ans car une cicatrice résiduelle peut persister.

Dans les autres cas, une technique à cicatrice horizontale dans le creux axillaire qui permet de bien corriger la face profonde, la face inférieure du bras et la partie antéro-interne de celui-ci dans ses deux tiers supérieurs permettant aussi un dégraissage et un affinement du bras lorsque cela est nécessaire.

Cette technique peut se faire sous anesthésie locale ou générale. Elle nécessite une journée d'hospitalisation et les suites sont, généralement, très rapides avec une cicatrice totalement invisible.

La récurrence est peu fréquente mais en cas de distension importante du bras, on peut être amené à ré-intervenir quelques années plus tard.