

Clinique de Chirurgie Esthétique Alphand
(Agréée par le ministère de la santé)
12 avenue Alphand – 75116 PARIS
Tél. : 01.45.00.10.88 – Fax : 01.40.67.10.52



LES CUISSES

Note technique sur le lifting de la face interne des cuisses

Indications

Cette intervention est indiquée chez les patientes qui présentent soit spontanément, soit à la suite d'un amaigrissement, une chute de la face interne des cuisses, donnant des plis disgracieux dans cette région.

Elle a pour effet de retendre la cuisse dans sa partie interne sur environ la moitié de la jambe. Les incisions sont faites dans l'entrejambe. Elles sont le plus souvent cachées à ce niveau. Dans certains cas, du fait de l'importance du lifting, elles peuvent descendre de 1 cm sur la face interne des cuisses.

Anesthésie

L'intervention se fait sous anesthésie générale ou péridurale et dure de 1 heure 30 à 2 heures. L'hospitalisation est de 24 heures.

Suites opératoires

Les derniers fils sont retirés au 15^{ème} jour environ, l'activité pouvant être reprise entre le 10^{ème} et le 15^{ème} jour.

Résultats

Les résultats sont bons mais l'intervention ne remet en tension que le tiers supérieur de la cuisse. Seule la qualité de la cicatrisation peut varier, les cicatrices peuvent être visibles dans certains cas. Elles pourront être améliorées secondairement.

Les complications

Une intervention de chirurgie esthétique est une intervention à part entière. Outre les complications infectieuses et cicatricielles toujours possibles, des complications imprévisibles peuvent survenir, le tabac et une mauvaise hygiène de vie les favorisent.