


**Clinique de Chirurgie Esthétique Alphand**  
(Agréée par le ministère de la santé)  
12 avenue Alphand – 75116 PARIS  
Tél. : 01.45.00.10.88 – Fax : 01.40.67.10.52



## LE LIFTING FRONTAL

### Note technique sur la chirurgie du lifting frontal

La chirurgie du lifting frontal est indiquée pour atténuer ou faire disparaître les rides horizontales, intersourcilières (rides du lion) ; pour relever la chute des sourcils lors du vieillissement et éventuellement, augmenter la hauteur du front.

L'incision est le plus souvent dans le cuir chevelu à distance de la ligne antérieure des cheveux mais dans certain cas, elle peut être faite à la lisière des cheveux.

La durée d'hospitalisation est en fonction du mode d'anesthésie qui peut être locale, semi générale ou générale allant de quelques heures à 24 heures d'hospitalisation.

Dans les suites opératoires, on peut noter une certaine insensibilité du cuir chevelu qui peut durer jusqu'à 6 mois, des ecchymoses au niveau des paupières inférieures le plus souvent qui vont disparaître en 10 à 15 jours.

Les agrafes situées dans le cuir chevelu très fines pour respecter les bulbes pileux sont retirées vers le 10<sup>ème</sup> jour.

Une fragilisation temporaire des cheveux est possible, elle est prévenue par un traitement adéquat.

Le lifting frontal ne compromet pas un lifting ultérieur de l'ensemble du visage ou peut être réalisé en même temps que celui-ci.

Cette intervention rajeunit considérablement la partie haute du visage. Elle est conseillée chez la jeune femme mais aussi chez la femme de plus de 50 ans lorsque les rides du front sont marquées.

### Les complications

Une intervention de chirurgie esthétique est une intervention à part entière. Outre les complications infectieuses et cicatricielles toujours possibles, des complications imprévisibles peuvent survenir, le tabac et une mauvaise hygiène de vie les favorisent.